

# Neues zur Reanimation

2017 ILCOR Zusammenfassung zur Herz-Kreislauf Stillstand

- a) Anwesende sollen beim Erwachsenen HDM durchführen
- b) Wenn möglich zusätzlich Mund-zu-Mund Beatmungen vornehmen

Ein Verhältnis von 30:2 bei der HDM ist beim Erwachsenen gegenüber allen anderen Varianten (zB: 15:2/5:1) zu bevorzugen.

- a) Anwesende sollten bei Kindern ( $\leq 18a$ ) mit OHCA HDM und Beatmung durchführen
- b) Wenn keine Beatmung möglich ist, jedenfalls HDM!

Sobald eine SGA oder ein ET platziert wurde, soll kontinuierliche HDM durchgeführt werden.

**2017 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Summary**  
[Circulation](#). 2017 Dec 5;136(23):e424-e440.  
doi: 10.1161/CIR.0000000000000541

HDM soll vom RD im Verhältnis 30:2 oder kontinuierlich durchgeführt werden bis ein ET oder eine SGA platziert wurde.

Krankenhaus

OHCA/BLS/Laien

Rettungsdienst

HDM = Herzdruckmassage  
OHCA = Out-of-Hospital Cardiac Arrest  
BLS = Basic Life Support  
ET = Endotrachealtubus  
SGA = Supraglottische Atemwegshilfe

**#dasFOAM**

Free Open Access Meducation auf Deutsch!

Created by Joseph Pultar for *dasFOAM* – January 2018